



Serostim[®] 4 mg
(somatropina) inyectable 5 mg
6 mg



Obtenga más información

Está comprobado que Serostim[®] provoca un aumento de peso y de la masa corporal magra y mejora la resistencia física cuando las personas que tienen VIH experimentan el síndrome de emaciación relacionado con el VIH (HIV-associated wasting, HIVAW). Tiene que estar siguiendo una terapia antirretroviral mientras toma Serostim[®].

Consulte a su proveedor de atención de salud (healthcare provider, HCP) acerca del **único tratamiento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA)** para obtener información sobre los tres síntomas clave del síndrome de emaciación relacionado con el VIH.

No desaproveche ni un momento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

No debe administrarse Serostim[®] si tiene lo siguiente:

- Una enfermedad crítica causada por una intervención quirúrgica, lesiones graves o un problema respiratorio severo
- Cáncer o si sigue un tratamiento contra este
- Problemas oculares causados por la diabetes
- Alergias a la hormona del crecimiento o a otros componentes de los viales de Serostim[®]

Consulte la sección Información de seguridad importante en las páginas 8 y 9 y visite Serostim.com/PI para obtener información completa para recetas.

¿Qué es el síndrome de emaciación relacionado con el VIH?

A menudo pasada por alto, el síndrome de emaciación relacionado con el VIH (HIVAW) puede generar un impacto en personas que padecen VIH. Usted puede sufrir de HIVAW incluso si su carga viral no es detectable, y este puede afectar su salud de manera significativa.

Estos son los tres síntomas clave del síndrome de emaciación relacionado con el VIH



Pérdida de peso no intencional

- Es posible que esté perdiendo peso con el tiempo sin siquiera intentarlo.
- Esto puede cambiar su apariencia, y es posible que sus amigos, familiares y compañeros de trabajo noten cambios en su peso corporal.



Pérdida de la masa corporal magra (MCM)

- La masa corporal magra (MCM) incluye la masa muscular, y es lo que su cuerpo pesaría sin incluir la grasa corporal.
- La pérdida de la MCM puede afectar sus niveles de energía, y es posible que tenga que descansar más.



Disminución de la resistencia física


- Es posible que se canse más rápido y que le resulte difícil realizar tareas sencillas.
- Es posible que no tenga suficiente energía.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA (continuación)

¿Qué le debo comunicar a mi médico antes de administrarme Serostim®?

- Si padece una enfermedad crítica causada por una intervención quirúrgica, lesiones graves o un problema respiratorio severo.
- Si tiene cáncer o tuvo esta enfermedad en el pasado.
- Si tiene diabetes, riesgo de contraer diabetes o niveles de azúcar en sangre más altos que lo normal. Se han informado nuevos casos de diabetes tipo 2 en pacientes que toman Serostim®.
- Si padece alergia a la hormona del crecimiento, al alcohol bencílico, a la sacarosa, al ácido fosfórico o al hidróxido de sodio.

¿Por qué sucede?



Las personas que aparecen en este folleto no son pacientes reales que toman Serostim®.

El síndrome de emaciación relacionado con el VIH podría tener que ver con algo más que la dieta.

El HIVAW puede producirse por varios motivos, como los cambios en el metabolismo, los niveles hormonales, el sistema inmunológico y la digestión o puede generarse a causa de una infección o inflamación repentina. La pérdida de peso no intencional con el paso del tiempo podría ser un signo de HIVAW, y siempre se debe hablar sobre esto con un profesional de atención de salud.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA (continuación)

- Si está tomando cualquier otro medicamento (con receta o de venta libre), vitaminas o suplementos, ya que estos medicamentos pueden tener interacciones farmacológicas entre sí. Es posible que su médico deba supervisar las interacciones farmacológicas.
- Si está amamantando, si está embarazada o si planea quedar embarazada. Se desconoce si Serostim® pasa a la leche materna o si podría dañar al bebé nonato.

Consulte la sección Información de seguridad importante en las páginas 8 y 9 y visite [Serostim.com/PI](https://www.serostim.com/PI) para obtener información completa para recetas.

No se debe ignorar el síndrome de emaciación relacionado con el VIH.



Comprender los riesgos del HIVAW:

- Las personas que padecen HIVAW tienen casi el doble de riesgo de fallecer por cualquier causa en comparación con aquellas personas que no tienen el síndrome.
- Con más de seis años de seguimiento, falleció un 5 % de las personas con HIVAW, en comparación con el 2 % de personas que no tenían el síndrome.
- El HIVAW aumenta la cantidad de consultas en el hospital: las personas que tienen HIVAW se hospitalizan cinco veces más y realizan el doble de visitas a la sala de emergencias que aquellas personas que no padecen el síndrome.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA (continuación)

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de Serostim[®] que se han informado, según los ensayos clínicos en pacientes que han recibido tratamiento contra el síndrome de emaciación relacionado con el VIH o caquexia?

- Inflamación, especialmente en las manos, los pies o alrededor de los ojos
- Dolores o rigidez óseos, musculares y articulares
- Hormigueo, entumecimiento y dolor en los dedos, en el dedo pulgar o en la muñeca
- Aumento de pecho en los hombres
- Náuseas
- Cansancio extremo

¿Es momento para comenzar la conversación?

Únicamente un proveedor de atención de salud (HCP) puede diagnosticarle el síndrome de emaciación relacionado con el VIH. Pregúntese lo siguiente para saber si es momento de hacer una consulta:

- ¿Ha perdido peso recientemente, involuntariamente, sin intentar hacerlo?
- ¿Siente que la ropa le queda más holgada?
- ¿Las personas han notado cambios en cuanto a su peso?
- ¿La pérdida de peso ha afectado su salud?
- ¿Siente que ha perdido resistencia física o se siente cansado? ¿O necesita descansar con más frecuencia?
- ¿Hace menos ejercicio o se siente menos activo debido al cansancio?
- ¿Siente que es más difícil hacer las actividades diarias o que se siente más cansado después de hacerlas?
- ¿Alguno de los síntomas impacta en cómo se siente en cuanto a su salud en general?

Si respondió "sí" a alguna de estas preguntas, es posible que sea el momento de consultar a su HCP sobre sus síntomas.


Consulte la sección Información de seguridad importante en las páginas 8 y 9 y visite Serostim.com/PI para obtener información completa para recetas.

Está comprobado que Serostim[®] es la única terapia aprobada por la FDA para tratar los tres síntomas clave del HIVAW.

De hecho, se ha demostrado en ensayos clínicos que provoca lo siguiente:



- Aumento del peso corporal
- Aumento de la masa corporal magra
- Mejora de la resistencia física




Los participantes que se administraron Serostim[®] mejoraron de manera significativa su resistencia física, según lo medido mediante ejercicio en bicicleta fija tras 12 semanas de tratamiento.


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA (continuación)

Otros efectos secundarios menos comunes, pero graves de Serostim[®] son los siguientes:

- Aumento del azúcar en sangre (hiperglucemia/diabetes) que puede incluir síntomas como aumento de la sed y de la micción, cansancio o problemas de concentración.
- Reacciones alérgicas graves que necesitan atención médica inmediata.
- Dolor y sensibilidad en el abdomen.
- Dolores de cabeza, cambios en la visión, náuseas o vómitos que requieren atención médica inmediata.



Para obtener más información, visite Serostim.com



Un total de 646 participantes completaron el estudio de 12 semanas y continuaron el tratamiento con Serostim[®] durante 12 semanas adicionales. 548 de esos participantes completaron 12 semanas adicionales de tratamiento activo. Los participantes que continuaron el tratamiento con Serostim[®] mantuvieron o mejoraron su resistencia física a lo largo del período de extensión del estudio.

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de Serostim[®] que se han informado, según los ensayos clínicos en pacientes que han recibido tratamiento contra el síndrome de emaciación relacionado con el VIH o caquexia?

- Inflamación, especialmente en las manos, los pies o alrededor de los ojos
- Dolores o rigidez óseos, musculares y articulares
- Hormigueo, entumecimiento y dolor en los dedos, en el dedo pulgar o en la muñeca
- Aumento de pecho en los hombres
- Náuseas
- Cansancio extremo



Consulte la sección Información de seguridad importante en las páginas 8 y 9 y visite Serostim.com/PI para obtener información completa para recetas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

No debe administrarse Serostim® si tiene lo siguiente:

- Una enfermedad crítica causada por una intervención quirúrgica, lesiones graves o un problema respiratorio severo
- Cáncer o si sigue un tratamiento contra este
- Problemas oculares causados por la diabetes
- Alergias a la hormona del crecimiento o a otros componentes de los viales de Serostim®

¿Qué le debo comunicar a mi médico antes de administrarme Serostim®?

- Si padece una enfermedad crítica causada por una intervención quirúrgica, lesiones graves o un problema respiratorio severo.
- Si tiene cáncer o tuvo esta enfermedad en el pasado.
- Si tiene diabetes, riesgo de contraer diabetes o niveles de azúcar en sangre más altos que lo normal. Se han informado nuevos casos de diabetes tipo 2 en pacientes que toman Serostim®.
- Si padece alergia a la hormona del crecimiento, al alcohol bencílico, a la sacarosa, al ácido fosfórico o al hidróxido de sodio.
- Si está tomando cualquier otro medicamento (con receta o de venta libre), vitaminas o suplementos, ya que estos medicamentos pueden tener interacciones farmacológicas entre sí. Es posible que su médico deba supervisar las interacciones farmacológicas.
- Si está amamantando, si está embarazada o si planea quedar embarazada. Se desconoce si Serostim® pasa a la leche materna o si podría dañar al bebé nonato.

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de Serostim® que se han informado, según los ensayos clínicos en pacientes que han recibido tratamiento contra el síndrome de emaciación relacionado con el VIH o caquexia?

- Inflamación, especialmente en las manos, los pies o alrededor de los ojos
- Dolores o rigidez óseos, musculares y articulares
- Hormigueo, entumecimiento y dolor en los dedos, en el dedo pulgar o en la muñeca
- Aumento de pecho en los hombres
- Náuseas
- Cansancio extremo

Otros efectos secundarios menos comunes, pero graves de Serostim® son los siguientes:

- Aumento del azúcar en sangre (hiperglucemia/diabetes) que puede incluir síntomas como aumento de la sed y de la micción, cansancio o problemas de concentración
- Reacciones alérgicas graves que necesitan atención médica inmediata
- Dolor y sensibilidad en el abdomen
- Dolores de cabeza, cambios en la visión, náuseas o vómitos que requieren atención médica inmediata

Estos no son todos los efectos secundarios posibles. Comuníquese a su médico los efectos secundarios que experimenta. Es posible que su médico le recete un medicamento para aliviar el dolor o disminuya la dosis de Serostim® para ayudarle a lidiar con algunos efectos secundarios.

Lo invitamos a que informe a la FDA sobre los efectos secundarios de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

¿Qué es Serostim® (somatropina) inyectable?

Serostim® es un medicamento inyectable con receta que se utiliza para el tratamiento de los pacientes que son VIH positivo y que padecen el síndrome de emaciación o caquexia a fin de aumentar la masa corporal magra y el peso corporal, además de mejorar la resistencia física. Es necesario realizar el tratamiento con terapia antirretroviral al mismo tiempo.

¿Cómo debe administrar Serostim®?

Un profesional de atención de salud debe capacitar a los pacientes y a los cuidadores sobre cómo mezclar e inyectar Serostim® antes de usarlo. Nunca comparta Serostim® con otra persona, ni siquiera si cambia la aguja. Las zonas para inyectarse son los brazos, las piernas y el abdomen. No se debe inyectar en la misma zona todos los días.

Evite inyectarse Serostim® en las zonas doloridas o con hematomas.

Para obtener información, visite www.serostim.com y consulte a su proveedor de atención de salud.

Obtener apoyo: El Patient AXIS Center®



El Patient AXIS Center® es un programa que les proporciona a los pacientes elegibles Serostim® (somatropina) inyectable con receta y ofrece una variedad de servicios de apoyo, como los siguientes:



Un administrador de casos dedicado que lo ayude a comprender su cobertura de seguro y si puede ser elegible o no para recibir asistencia financiera, y que actúe como principal punto de comunicación para usted y su equipo de cuidado con el motivo de ayudarlo a abordar sus inquietudes



Copago y otros programas de asistencia financiera que lo ayuden a cubrir el costo de los medicamentos recetados, según los requisitos de elegibilidad



Capacitación para inyectarse con el fin de que pueda preparar e inyectarse Serostim® con confianza (disponible en línea)



Especialistas de apoyo en lactancia para que respondan las preguntas que pueda tener en cuanto a Serostim®

Pídale a su proveedor de atención de salud que lo inscriba hoy para obtener Serostim® de manera más rápida.

PATIENT
AXIS
CENTER®

1-877-714-AXIS (2947)

De lunes a viernes
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del este


Asistencia financiera

Varios planes de salud comerciales, Medicare, Medicaid estatal y los Programas de Asistencia para los Medicamentos contra el Sida (AIDS Drug Assistance Programs, ADAP) cubren Serostim®.

Con motivo de brindarle asistencia en cuanto a los costos relacionados, también ofrecemos programas de apoyo financiero para los pacientes elegibles.

Programa De Asistencia De Copago Para Serostim®

Elimina los gastos de bolsillo para la mayoría de los pacientes elegibles con cobertura comercial o privada.*



Para obtener información en cuanto a los requisitos de elegibilidad y para descargar o activar una tarjeta de copago, visite AffordingSerostim.com

Programa De Asistencia Para Pacientes

Es posible que los pacientes elegibles que reúnan ciertos criterios financieros y médicos reciban Serostim® sin ningún costo.*

* Sujeto a elegibilidad; se aplican restricciones.


¿Está listo para aprovechar esta oportunidad?

Si se le ha recetado Serostim®, llame al Patient AXIS Center® para comenzar a recibir hoy apoyo para su tratamiento.

Consulte la sección Información de seguridad importante en las páginas 8 y 9 y visite Serostim.com/PI para obtener información completa para recetas.

Manténgase Informado, Capacitado Y A La Vanguardia


Serostim[®] 4 mg
(somatropina) inyectable 5 mg
6 mg



Descargue GRATIS el Centro de Recursos para el VIH en Medisafe: una aplicación externa para acceder a herramientas, información y recursos. La aplicación le recuerda cuándo debe tomar sus medicamentos e ir a las citas con su HCP, hace un seguimiento de sus síntomas y lo ayuda a estar alerta en cuanto a los indicadores de salud clave. Manténgase organizado e informado en un solo lugar.



Escanee el código QR o **haga clic aquí**, luego ingrese 7QCW para iniciar su experiencia personalizada.

Hable hoy con su HCP sobre Serostim[®]

Consulte la sección Información de seguridad importante en las páginas 8 y 9 y visite [Serostim.com/PI](https://www.serostim.com/PI) para obtener información completa para recetas.

**EMD
SERONO**

©2025 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania o sus afiliados. Todos los derechos reservados. EMD Serono es el negocio de Cuidado de Salud de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania en Estados Unidos y Canadá. Serostim y Axis Center son marcas registradas de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania o sus afiliados. US-SER-00533 6/25